

妊娠を希望する女性、妊婦とそのご家族へ

愛知県で

風しんの報告数が増加しています 風しんからお腹の子どもを守りましょう

- 妊婦が風しんにかかることで、生まれながらにして眼や耳、心臓に障害をもった子どもが生まれることがあります。
- この障害は、先天性風しん症候群（CRS）とよばれています。

【皆様にできること】

妊婦

妊娠を
希望している人

妊婦の同居家族

□ 抗体検査を受けましょう。

抗体価が低い場合 ↓ 抗体価が低い場合 ↓

□ ワクチン接種を検討しましょう。

※ワクチン接種後2ヶ月程度は、避妊するようにしましょう。

名古屋市内の方
公費でMR ワクチン接種
可能です。

- 不要不急の外出を避け、人混みに近づかないようにしましょう。
 - 風しんを疑う症状（発熱、発疹など）が出現した際は、医師に相談しましょう。
- ※妊娠中は、ワクチン接種を受けることができません。



厚生労働省

風しんについて、くわしくはこちら ▶

風しん 厚生労働省

検索



ワクチン（公費）無料接種の接種対象の方はこちら ↓（お問い合わせは内科窓口まで）

ア 妊娠を希望する女性

イ 妊娠を希望する女性のパートナー

ウ 妊娠中の女性のパートナー

抗体検査の結果が風しんに対する免疫が不十分と判断された方

男性の場合 HI法で16倍未満の方、またはEIA（IgG）法で6.0未満

女性の場合 HI法で32倍未満の方、またはEIA（IgG）法で8.0未満